


## PARESTESIAS DE LA REGIÓN GENITAL EN ALGUNOS CASOS DE IMPOTENCIA. (1913o).



### Sandor Ferenczi.

Algunos pacientes que sufren impotencia psico-sexual se lamentan a menudo de “no sentir” su pene; otros hablan explícitamente de una *frigidez* de la región genital; otros incluso de una sensación de *retracción* del pene. Todas estas parestesias se intensifican en las tentativas de coito. Más tarde, durante el análisis, los pacientes indican a menudo espontáneamente que “sienten mejor” su pene, que la sensación de frío disminuye, que su pene (no erecto) es algo más “consistente”, etc... Por razones técnicas, no es recomendable emprender un examen físico basado en tales quejas. Sin embargo, en algunos casos no he podido evitarlo, pero no he llegado a constatar objetivamente ningún “frío” particular, ni anestesia, ni analgesia; por el contrario, he visto retracciones. Gracias al análisis he establecido que la fuente inconsciente de esta sensación era la angustia infantil de *castración*, que también es la causa, según he mostrado anteriormente,<sup>1</sup> de las *sensaciones de retracción* que numerosos pacientes sufren en la base del pene y a nivel del perineo, en particular cuando el analista (el padre) les inspira angustia. Uno de estos pacientes se despertó una noche con la sensación de “no sentir en absoluto su pene”. Se angustió mucho y tuvo que convencerse de que todavía lo poseía tocando sus órganos genitales. La explicación era la siguiente: en su infancia, fue amenazado de castración por haber tocado sus órganos genitales y haberse masturbado; de aquí derivaba “la angustia de tocar” el pene. Los tocamientos ansiosos de su pene aparecieron como un compromiso entre el antiguo deseo de masturbación y el temor de un severo castigo. (“El retorno del rechazo”.) Tales parestesias constituyen a menudo un buen índice de los progresos y retrocesos que se producen en el estado del paciente, debido a su carácter variable. Junto a las fantasías incestuosas inconscientes (masturbadoras), las causas más frecuentes de la impotencia psíquica son los temores a la castración; pero, en general, ambos se compaginan: temor a la castración como castigo del onanismo incestuoso.<sup>2</sup>

(Sandor Ferenczi. Obras Completas, Psicoanálisis Tomo II, Ed. Espasa-Calpe, S.A. Madrid, 1984).

*Volver a Selecciones Ferenczianas*

PÁGINAS DEL PORTAL ALSF-CHILE

<http://www.alsf-chile.org> - <http://www.biopsique.cl> - <http://www.indepsi.cl>

Contacto: [alsfchile@alsf-chile.org](mailto:alsfchile@alsf-chile.org).

1.- “Síntomas transitorios durante un psicoanálisis” O.C. I.

2.- “Interpretación y tratamiento psicoanalítico de la impotencia psicosexual.” O.C. I.