

ESCRITO 52. PARÁLISIS OCULAR CONJUGADO CON PARECIA OCULAR^{1*}.



Sandor Ferenczi (1903d). (Traducción: Equipo Indepsi - Biopsique)

En 1894, el hombre de treinta años que ya he mencionado anteriormente acá, fue por primera vez, víctima de una úlcera. En Agosto de 1906, aparecieron aparentemente los primeros síntomas oculares: de partida: una ambliopía, luego una importante diferencia pupilar, y finalmente una parálisis completa de sus globos oculares.

Los rectos externos derecho e izquierdo dejaron de funcionar. La aparición de sus síntomas permiten sospechar, además de sífilis, la existencia de un foco localizado en el centro coordinador de los movimientos oculares y la mirada.

Sin embargo, como el funcionamiento del músculo interno (inyección de solución de mercurio) se recuperó plenamente y como el músculo externo no mejoró del todo, fue etiológicamente imposible informar la parálisis de sus dos músculos como producto de una causa común. Por esta razón se hace necesario un nuevo examen, en particular, el registro y la localización precisa de la lesión a nivel del Pons.

Volver a Selecciones Ferenczianas

PÁGINAS DEL PORTAL ALSF-CHILE

<http://www.alsf-chile.org> - <http://www.biopsique.cl> - <http://www.indepsi.cl>

Contacto: alsfchile@alsf-chile.org.

^{1*}.- “Polyneuritis.ritkább esete. Conjugált szembénulást utánzó szemizomhüdések”, en Orvosi Hetilap, 1906, n° 48.